

2020年産米 生産記録

確認欄	
確認月日:	確認月日:

区分	土づくり資材、肥料名		施用月日	施用量
土づくり	資材名	シリカパンチF	10月19日~20日	100 kg/10a
			月 日 ~ 日	kg/10a
	堆肥		月 日 ~ 日	kg/10a
施肥	基肥	イソ酸加里入りリコー アミノシリ2号	5月16日~17日	45 kg/10a
	中間肥		月 日 ~ 日	kg/10a
	穂肥①		月 日 ~ 日	kg/10a
	穂肥②		月 日 ~ 日	kg/10a
	穂肥③		月 日 ~ 日	kg/10a

区分	農薬名	使用月日	使用量
雑草防除	インパラ-1キロ粒剤	5月16日~17日	⑤ 1 kg/10a ⑥ 1 g/10a ⑦ 1 ml/10a ⑧ 1 l/10a 倍液
	ブイゴールSH1キロ粒剤	6月6日~日	⑤ 1 kg/10a ⑥ 1 g/10a ⑦ 1 ml/10a ⑧ 1 l/10a 倍液
	グリーンチャーバースME液剤	6月20日~日	⑤ 100 kg/10a ⑥ 100 g/10a ⑦ 100 ml/10a ⑧ 100 l/10a 100倍液 100 l/10a
		月 日 ~ 日	⑤ kg/10a ⑥ g/10a ⑦ ml/10a ⑧ 倍液 l/10a

区分	農薬名		使用月日	使用量・希釈倍率
病害虫防除	種子消毒	モミガードC	4月15日~日	200 倍液
	播種時防除	ダコレート水和剤	4月25日~日	500 倍液
		カスミン液剤	4月25日~日	5 倍液
	ハウス防除		月 日 ~ 日	
	苗箱施薬	ルーチンアドスピノサチン	4月25日~日	50 g/1箱
	本田防除	ラブサイドフロアブル	8月9日~日	⑤⑥ 8 倍液 kg/10a ⑦ 8 倍液 0.8 l/10a ⑧ 8 倍液 0.8 l/10a
		キラアフロアブル	8月9日~日	⑤⑥ 8 倍液 kg/10a ⑦ 8 倍液 0.8 l/10a ⑧ 8 倍液 0.8 l/10a
		スタークル液剤10	8月14日~日	⑤⑥ 8 倍液 kg/10a ⑦ 8 倍液 0.8 l/10a ⑧ 8 倍液 0.8 l/10a
			月 日 ~ 日	⑤⑥ kg/10a ⑦ l/10a ⑧ 倍液 l/10a

※粒剤の使用は⑤、ジャンボ剤は⑥、フロアブル剤は⑦、液剤は⑧、粉剤は⑨へ記入して下さい。

生産者氏名 (組織名)

播種又は 箱苗購入	種子購入 <input type="checkbox"/> に \checkmark して 下さい。	<input checked="" type="checkbox"/> 農協 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 未消毒 <input checked="" type="checkbox"/> 消毒済	箱苗購入	農協・その他 ()
	播種	4月25日~月 日	<input type="checkbox"/> 未消毒 <input checked="" type="checkbox"/> 消毒済		
本田管理	荒起し	4月28日~5月1日		田植	5月16日~5月17日
	代播き・均平	5月12日~5月13日		(植付株数)	70 株

※田植は5月15日を中心に行いましょう。

畦畔草刈り	1回目 5月2日	2回目 6月6日	3回目 7月18日
	4回目 8月29日	5回目 月 日	
溝掘り	6月12日~6月13日	月 日 ~ 月 日	
中干し	6月13日~6月18日	月 日 ~ 月 日	
出穂	8月4日		
出穂後20日間の水管理	灌水	間断かん水	その他 ()
落水時期	刈取2週間前	刈取5~7日前	その他 ()

※溝掘りは6月初旬までに、確実に実施しましょう。
※中干しは田植後1か月以内に開始しましょう。

収穫期	刈取日 9月 ¹⁵ 16日~9月20日	乾燥・調製の方法	共乾施設・自己乾燥
-----	--------------------------------	----------	-----------

栽培圃場明細

一覽表添付可 共済面積で記入して下さい。

番号	所在地(地名・番地)	栽培面積(a)	16	
1	別紙参照	.	17	.
2		.	18	.
3		.	19	.
4		.	20	.
5		.	21	.
6		.	22	.
7		.	23	.
8		.	24	.
9		.	25	.
10		.	26	.
11		.	27	.
12		.	28	.
13		.	29	.
14		.	30	.
15			合計	筆 a