

2020年度 米コシヒカリ基準様式 栽培履歴報告書

04 0000667-01-01

| | | | | |
|--------------|--------------|--------|------|----------------------|
| 支所コード 201 | 支所名 大沢野支店 | 生産者コード | 生産者名 | 作業開始年月 2020年03月より |
| 電話番号 | | 面積(a) | | |

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| 種子購入先 1 JAあおば 9 JA以外 | JAあおば以外の購入先 | 消毒区分 1 消毒済, 2 消毒済済, 9 未消毒 | 購入種子量 600 kg | 地区名 船橋 |
| 苗圃購入先 1 JAあおば 9 JA以外 | JAあおば以外の購入先 | 購入苗箱数 | 使用苗箱数(10aあたり) 18箱 | 圃場枚数/坪 50株 |
| 圃場組合名 | | | 横橋 | |

| | |
|---|--|
| 圃出穂期の確認 出穂期の確認(落水開始日) 8/17 1圃場で約半分が収穫した日 | 圃土改材投入量(kg) [秋取布含む] 農薬名 10aあたり投入量(kg) 農産品名 10aあたり投入量 |
| 圃土改材投入量(kg) [秋取布含む] 農産品名 10aあたり投入量 | 圃土改材投入量(kg) [秋取布含む] 農産品名 10aあたり投入量 |
| 圃土改材投入量(kg) [秋取布含む] 農産品名 10aあたり投入量 | 圃土改材投入量(kg) [秋取布含む] 農産品名 10aあたり投入量 |
| 圃土改材投入量(kg) [秋取布含む] 農産品名 10aあたり投入量 | 圃土改材投入量(kg) [秋取布含む] 農産品名 10aあたり投入量 |

| 作業名 | 作業日 | 作業名 | 作業日 | 作業名 | 作業日 | 作業名 | 作業日 |
|--------|------|----------|------|-----------|------|--------|------|
| 播種開始日 | 4/8 | しるかき開始日 | 5/3 | 田植え開始日 | 5/7 | 刈取り開始日 | 6/8 |
| 中干し開始日 | 6/15 | 出穂後灌水開始日 | 7/30 | 20日間灌水終了日 | 8/25 | 刈取り予定日 | 9/15 |

| 用途 | 肥料コード | 肥料名 | 施肥日 | 投入量(10aあたり) | 用途 | 肥料コード | 肥料名 | 施肥日 | 投入量(10aあたり) |
|-------|---------|----------------|-----|-------------|-------|---------|-----------|------|-------------|
| 高収化肥料 | 9091000 | Jコートコシ1 | | | 高収化肥料 | 9702000 | PKケイサン | 6/27 | 15 kg |
| 高収化肥料 | 9092000 | Jコートコシ2 | | | 高収化肥料 | 9682000 | 追肥3号 | 7/25 | 5 kg |
| 高収化肥料 | 9095000 | けい酸加工入りJコートコシ1 | | | 高収化肥料 | 9601000 | LP98コンポスト | 5/7 | 31 kg |
| 高収化肥料 | 9096000 | けい酸加工入りJコートコシ2 | | | | | | | |

あおば農業協同組合 00020001 米 米基準(1)

2020年度 米コシヒカリ基準様式 栽培履歴報告書

05 0000667-02-01

| | | | | |
|--------------|--------------|--------|------|----------------------|
| 支所コード 201 | 支所名 大沢野支店 | 生産者コード | 生産者名 | 作業開始年月 2020年03月より |
| 電話番号 | | 収穫開始年月 | | |

| 用途 | 農薬コード | 農薬名 | 使用量 倍率等 | 使用時期 | 使用 回数 | 対象病害虫 防除薬剤名 | 散布日 | 使用量・倍率等 |
|-----|-------|--------------|------------|--------------------------|----------|--|------|---------|
| 殺菌剤 | 19736 | モモガードC水和剤 | 200倍 | 播種前 | 1回 | いもち病・こまめ病・結核病・白葉病・もろこし病・葉斑病・葉枯病・穂腐病・穂白化病・穂腐病・穂白化病・穂腐病・穂白化病 | 3/19 | 200倍 |
| 殺菌剤 | 23955 | ナエファインフロアブル | 1000倍 | は種時から緑化期 | 2回 | 穂腐病・葉斑病・葉枯病・穂腐病・穂白化病・穂腐病・穂白化病・穂腐病・穂白化病 | | |
| 殺菌剤 | 24029 | ルーデンプライト水和剤 | 50c | は種時(圃土内)~移植前 | 1回 | 穂腐病・葉斑病・葉枯病・穂腐病・穂白化病・穂腐病・穂白化病・穂腐病・穂白化病 | 4/8 | 50c |
| 除草剤 | 23327 | かわつぐ1キロ粒剤 | 1kg | 移植直後~元工1週間後(1次)移植後30日まで | 1回 | 水田一年生雑草(9/19)・1次(9/19)・2次(9/19)・3次(9/19) | | kg |
| 除草剤 | 24063 | エンペラー1キロ粒剤 | 1kg | 移植直後~元工5週間後(1次)移植後30日まで | 1回 | 水田一年生雑草(7/27)・2次(7/27)・3次(7/27) | 5/7 | 1kg |
| 除草剤 | 23335 | キクトモ1キロ粒剤 | 1kg | 移植直後~元工25週間後(1次)移植後30日まで | 1回 | 水田一年生雑草(7/27)・2次(7/27)・3次(7/27) | | kg |
| 除草剤 | 23745 | ゴエモンジャンボ | 300g | 移植直後~元工25週間後(1次)移植後30日まで | 1回 | 水田一年生雑草(7/27)・2次(7/27)・3次(7/27) | | g |
| 除草剤 | 23797 | ポデーガードプロジャンボ | 300g | 移植直後~元工25週間後(1次)移植後30日まで | 1回 | 水田一年生雑草(7/27)・2次(7/27)・3次(7/27) | | g |
| 除草剤 | 24073 | エンペラー豆つぶ250 | 250g | 移植直後~元工3週間後(1次)移植後30日まで | 1回 | 水田一年生雑草(7/27)・2次(7/27)・3次(7/27) | | g |

注1)「使用量・倍率等」欄は、粒剤・粉剤は10aあたり投入量、乳剤液剤等は希釈倍率、播種用薬剤は1箱あたりで記入して下さい。
注2)この帳票の情報は、JAあおばにおいて生産履歴システムに使用します。

あおば農業協同組合 00020001 米 米基準(1)

0018
 2020年度 米コシヒカリ基準様式 栽培履歴報告書 0000-0000 05 0000667 - 03 - 01

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------|------|----------------------|-----------------|
| 支所コード 201 | 支所名 大沢野支店 | 生産者コード | 生産者名 | 作業開始年月 2020年03月より | 記録開始年月 年 月 日 |
|--------------|--------------|--------|------|----------------------|-----------------|

| 用途 | 農薬コード | 農薬名 | 使用量・倍率等 | 使用時期 | 使用回数 | 対象病害虫 | 作業者名・防除員氏名 | 散布日 | 使用量・倍率等 |
|-----|-------|-----------------|----------|----------------------------------|------|------------------------------------|------------|------|--------------|
| 除草剤 | 21586 | マメツトSM1キロ粒剤 | 1kg | 播種後15日(前5 葉期以降)〜 23.5葉期(前) | 1回 | 水田一年生雑草 アザミ、稗類によ る雑草(水田用) | | | kg * * * * * |
| 除草剤 | 23579 | ワイドショット1キロ粒剤 | 1kg | 播種後15日〜 23.5葉期(前) | 1回 | 水田一年生雑草 クサキ、オモミ、クサ クサ、クサ、クサ | | | kg * * * * * |
| 除草剤 | 23689 | レプラス1キロ粒剤 | 1kg | 播種後15日〜 23.5葉期(前) | 1回 | 水田一年生雑草 クサキ、オモミ、クサ クサ、クサ、クサ | | | kg * * * * * |
| 除草剤 | 16123 | バサグラン粒剤(ナトリウム塩) | 3~4kg | 播種後15~50 日(前) | 1回 | 水田一年生雑草 (イネ科を除く)ウツ クサ、オモミ、クサ | | | kg * * * * * |
| 除草剤 | 23867 | セカンドショットSジャンボMX | 500g | 播種後15日〜 23.5葉期(前) | 1回 | 水田一年生雑草 クサキ、オモミ、クサ クサ、クサ、クサ | | | kg * * * * * |
| 除草剤 | 19200 | クリンチャーバSM液剤 | 1000ml | 播種後15日〜 23.5葉期(前) | 2回 | 水田一年生雑草 クサキ、オモミ、クサ クサ、クサ、クサ | | | ml * * * * * |
| 除草剤 | 23958 | トドメMF1キロ粒剤 | 1kg | 播種後15日〜 23.5葉期(前) | 3回 | 水田一年生雑草 | | | kg * * * * * |
| 除草剤 | 23959 | トドメMF乳剤 | 200ml | 播種後15日〜 23.5葉期(前) | 2回 | 水田一年生雑草 | | | ml * * * * * |
| 除草剤 | 22586 | ヒエクリーン豆つぶ250 | 250g | 播種後15日〜 23.5葉期(前) | 1回 | 水田一年生雑草 | | | g * * * * * |
| 除草剤 | 19642 | ノミー液剤 | 50~100ml | 播種後15日〜 23.5葉期(前) | 1回 | 水田一年生雑草 | | | ml * * * * * |
| | | 11+77ラン液剤 | | | | | | 6/21 | 600ml |

注1)「使用量・倍率等」欄は、粒剤・粉剤は10gあたり投入量、乳剤液剤等は希釈倍率、播種用薬剤は1箱あたりで記入して下さい。
 注2)この帳票の情報は、JAあおばにおいて生産履歴システムに使用します。

0002 0001 米 米基準(1)

0018
 2020年度 米コシヒカリ基準様式 栽培履歴報告書 0000-0000 05 0000667 - 04 - 01

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------|------|----------------------|-----------------|
| 支所コード 201 | 支所名 大沢野支店 | 生産者コード | 生産者名 | 作業開始年月 2020年03月より | 記録開始年月 年 月 日 |
|--------------|--------------|--------|------|----------------------|-----------------|

| 用途 | 農薬コード | 農薬名 | 使用量・倍率等 | 使用時期 | 使用回数 | 対象病害虫 | 作業者名・防除員氏名 | 散布日 | 使用量・倍率等 |
|-----|-------|-----------------|----------------|----------|------|---|------------|------|--------------|
| 殺菌剤 | 19013 | モンカットファイン粉剤20DL | 3~4kg | 収獲14日前まで | 3回 | 穀粒腐敗(褐色 斑病) 穀粒 腐敗(褐色斑病) いもち病(粟 粒病) 粟粒病 (アザミ) 粟粒病 | | | kg * * * * * |
| 殺菌剤 | 17954 | ノンプラス粉剤OL | 3~4kg | 収獲7日前まで | 2回 | 穀粒腐敗(褐色 斑病) 穀粒 腐敗(褐色斑病) いもち病(粟 粒病) 粟粒病 (アザミ) 粟粒病 | | | kg * * * * * |
| 殺菌剤 | 14687 | パンタックゾル | 500~1000 倍 | 収獲14日前まで | 3回 | 穀粒腐敗 | | | 倍 |
| 殺菌剤 | 21027 | ビームスタークル粉剤5DL | 3~4kg | 収獲7日前まで | 3回 | いもち病(アザ ミ) 粟粒病(ア ザミ) 粟粒病 (アザミ) 粟粒 病(アザミ) 粟 粒病(アザミ) | | | kg * * * * * |
| 殺菌剤 | 22036 | ビームエイトスタークルゾル | 1000倍 | 収獲7日前まで | 3回 | いもち病(アザ ミ) 粟粒病(ア ザミ) 粟粒病 (アザミ) 粟粒 病(アザミ) | | 8/19 | 1000倍 100g |
| 殺菌剤 | 21470 | キラップ粉剤DL | 3~4kg | 収獲14日前まで | 2回 | いもち病(アザ ミ) 粟粒病(ア ザミ) 粟粒病 (アザミ) 粟粒 病(アザミ) | | | kg * * * * * |
| 殺菌剤 | 21471 | キラップフロアブル | 1000~ 2000倍 | 収獲14日前まで | 2回 | いもち病(アザ ミ) 粟粒病(ア ザミ) 粟粒病 (アザミ) 粟粒 病(アザミ) | | 8/15 | 1000倍 100g |
| 殺菌剤 | 20814 | スタークル粉剤DL | 3kg | 収獲7日前まで | 3回 | いもち病(アザ ミ) 粟粒病(ア ザミ) 粟粒病 (アザミ) 粟粒 病(アザミ) | | | kg * * * * * |
| 殺菌剤 | 21259 | スタークル液剤10 | 1000倍 | 収獲7日前まで | 3回 | いもち病(アザ ミ) 粟粒病(ア ザミ) 粟粒病 (アザミ) 粟粒 病(アザミ) | | | 倍 |
| 殺菌剤 | 16753 | トレボン粉剤DL | 3~4kg | 収獲7日前まで | 3回 | いもち病(アザ ミ) 粟粒病(ア ザミ) 粟粒病 (アザミ) 粟粒 病(アザミ) | | | kg * * * * * |
| 殺菌剤 | 16758 | トレボン乳剤 | 1000~ 2000倍 | 収獲21日前まで | 3回 | いもち病(アザ ミ) 粟粒病(ア ザミ) 粟粒病 (アザミ) 粟粒 病(アザミ) | | | 倍 |
| 殺菌剤 | 20580 | アミスターエイト | 1000倍 | 収獲14日前まで | 3回 | いもち病(アザ ミ) 粟粒病(ア ザミ) 粟粒病 (アザミ) 粟粒 病(アザミ) | | | 倍 |
| 殺菌剤 | 22078 | イモチエースキラップ粉剤 | 3kg | 収獲35日前まで | 1回 | いもち病(アザ ミ) 粟粒病(ア ザミ) 粟粒病 (アザミ) 粟粒 病(アザミ) | | | kg * * * * * |
| 殺菌剤 | 22332 | スタークル豆つぶ | 250g | 収獲7日前まで | 3回 | いもち病(アザ ミ) 粟粒病(ア ザミ) 粟粒病 (アザミ) 粟粒 病(アザミ) | | | g * * * * * |

注1)「使用量・倍率等」欄は、粒剤・粉剤は10gあたり投入量、乳剤液剤等は希釈倍率、播種用薬剤は1箱あたりで記入して下さい。
 注2)この帳票の情報は、JAあおばにおいて生産履歴システムに使用します。

0002 0001 米 米基準(1)