

令和2年(2020)産米 栽培履歴記録

住所	電話番号	品種名
生産者名	対象水田面積 a	コシヒカリ

担当者確認欄

種子購入の場合

苗箱消毒	イチバン	3月29日～30日(2日間)	500倍液
種子購入	農協(乾籾・湯消毒済み)・農協以外(購入先)		
種子消毒	モミガードC水和剤・食酢	月 日～ 日(1日間)	200倍液
播種月日	播種量(120g/箱 撒き)	4月12日～18日(4日間)	
播種時消毒	ペンレート水和剤・タチガレエースM液剤	4月12日～18日(4日間)	500倍液
播種時床土	加工培土・いなほ粒状培土・ホーネンス培土・その他()		

苗購入の場合

購入先	購入先()	【発芽苗】 枚	【成苗】 枚
-----	--------	---------	--------

土づくり	リカパンチF・粒状ケイカル・その他(石灰窒素)	令和元年10月26日～28日(2日間)	100kg/10a		
	苦土重焼燐30	月 日～ 日(日間)	kg/10a		
	発酵けいふん・その他(牛糞堆肥)	月 日～ 日(日間)	kg/10a		
秋耕起	令和元年11月5日～11日(7日間)	春耕起	4月8日～11日(4日間)		
荒播き	4月19日～23日(5日間)	代かき	5月3日～6日(4日間)		
田植え日	5月4日～11日(8日間)	栽植本数	70株/3.3㎡		
箱 施 薬	アグレットフルテラ箱粒剤 その他(ファーストオリゼパテイト箱粒剤)	4月12日～18日(4日間)	50g/箱		
初期除草剤	マーシュett1キロ粒剤・クラール1キロ粒剤 その他()	5月4日～11日(8日間)	1kg/10a		
基 肥	BB側条基肥206 コシヒカリ 1号 2号	5月4日～11日(8日間)	32kg/10a		
	早生専用・晩生専用()	月 日～ 日(日間)	kg/10a		
一発除草剤	キチット1キロ粒剤・ボデーガード1キロ粒剤 カチボン1キロ粒剤	5月13日～17日(5日間)	kg/10a	粒剤 1kg/10a	
	ガンガン 粒剤	月 日～ 日(日間)	kg/10a	粒剤 kg/10a	
	シリウスエグザ顆粒	月 日～ 日(日間)	g/10a	顆粒 60g/10a	
早期追肥		月 日～ 日(日間)	kg/10a		
中間追肥	エスアイ加里らくだ・その他(塩化カリ)	6月18日～21日(4日間)	7kg/10a	7kg/10a	
溝切り日	6月7日～13日(7日間)	中干し開始日	6月7日～17日(内5日間)		
中後期除草剤	バサグラン粒剤	月 日～ 日(日間)	kg/10a	粒剤 kg/10a	
	ヒエクリーン1キロ粒剤	月 日～ 日(日間)	kg/10a	粒剤 kg/10a	
	その他	月 日～ 日(日間)	/10a		
穂 肥①	穂肥534・NK化成C-12・LP追肥38号	7月19日～25日(6日間)	7kg/10a		
穂 肥②	穂肥534・NK化成C-12・LP追肥38号	月 日～ 日(日間)	kg/10a		
出穂日	8月 2日	*出穂日は圃場全体の5割程度穂が出てきている状態です。			
本田防除	粉剤	モンセレン粉剤DL	月 日～ 日(日間)	kg/10a	粉剤 4kg/10a
		ラブサイドスタークル粉剤DL	月 日～ 日(日間)	kg/10a	粉剤 4kg/10a
		キラップ粉剤DL	月 日～ 日(日間)	kg/10a	粉剤 4kg/10a
		その他()	月 日～ 日(日間)	kg/10a	粉剤 g/10a
	粒剤	イモチエースキラップ粒剤	月 日～ 日(日間)	kg/10a	粒剤 3kg/10a
	液剤	スタークル+ラブサイドフロアブル キラップフロアブル	7月29日～ 日(1日間)	100cc/10a	液剤 100cc/10a
無人ヘリコプター防除		8月4日～ 日(1日間)	100cc/10a	液剤 100cc/10a	
刈取り日	9月6日～ 日(日間)	刈取り前 落水日	8月25日～27日(7日間)		
乾燥調製	自己乾燥 共乾施設() 乾燥委託()	乾燥時間	通風乾燥	3時間	
			温風乾燥	8時間	
			乾燥温度	43度	

【備考】(注1) 施肥、防除等の生産基準は、農協の栽培層を基本とする。

【備考】(注2) 原則として品種ごとに1枚にまとめる。栽培面積が大きく地域によって栽培基準が異なる場合や同一栽培基準でも田植時期等によって栽培内容や時期が異なる場合は複数枚に記入する。